

в процентах

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет														
		14-17	18-19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 - 44	45 – 49	50 - 54	55 – 59	60 – 64	65 - 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Лица в возрасте 14 лет и более -всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по самооценке состояния своего здоровья																
хорошее	33.5	90.6	100.0	85.0	60.2	73.0	31.0	47.0	5.3	11.1	7.4	33.8	6.0	4.7	0.0	0.0
удовлетворительное	55.8	9.4	0.0	6.7	39.8	27.0	65.2	53.0	87.8	83.5	80.0	53.6	47.7	39.7	65.5	59.9
плохое	9.1	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	3.8	0.0	6.8	5.4	9.2	11.0	45.1	51.9	27.0	20.0
очень плохое	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	1.2	3.6	7.5	20.1
затрудились ответить	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
отказ от ответа	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Лица в возрасте 14 лет и более -всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе																
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	42.2	0.0	63.3	0.0	17.0	12.2	23.8	21.8	36.8	60.9	71.4	55.0	82.0	79.2	100.0	100.0
из них имеют																
повышенное артериальное давление	33.0	0.0	0.0	0.0	6.7	2.8	16.9	20.1	24.2	51.0	60.6	48.3	64.1	76.0	84.9	85.5
диабет или повышенный сахар в крови	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	7.5	5.0	7.2	32.3	27.1	2.6
высокий уровень холестерина в крови	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	6.3	6.6	18.6	38.7	11.1	42.8	32.4	23.7	14.7
инфаркт миокарда	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.6	10.4	26.0	0.0	9.3
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.3	29.5	7.3	19.9	16.3
туберкулез	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
гепатит	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
сколиоз (искривление позвоночника)	3.4	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	3.0	2.2	1.5	1.9	34.3	12.4	0.0	14.5
остеопороз	2.5	0.0	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.1	0.0	5.0	4.1	4.9	0.0	14.5
низкий уровень гемоглобина или анемия	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	7.5	5.4	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	9.3
заболевание желудочно-кишечного тракта	11.2	0.0	0.0	0.0	11.5	7.8	5.1	8.3	12.5	19.0	12.5	16.8	18.4	16.1	24.5	20.0
онкологическое заболевание	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	7.5	9.3
аллергия на пищевые продукты	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.6	3.4	6.6	2.2	1.6	0.0	2.6	0.0	4.9	1.6	0.0
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Все респон- денты	в том числе в возрасте, лет														
		14-17	18-19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 - 44	45 – 49	50 - 54	55 – 59	60 – 64	65 - 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	57.8	100.0	36.7	100.0	83.0	87.8	76.2	78.2	63.2	39.1	28.6	45.0	18.0	20.8	0.0	0.0
затруднились ответить	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
отказ от ответа	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Лица в возрасте 14 лет и более, имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием																
имеют одно заболевание (состояние)	46.5	-	100.0	-	63.9	100.0	63.7	41.0	50.8	42.1	35.6	47.0	41.6	22.9	48.2	51.8
имеют два и более заболевания (состояния)	53.5	-	0.0	-	36.1	0.0	36.3	59.0	49.2	57.9	64.4	53.0	58.4	77.1	51.8	48.2